



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)

واحد آموزش سلامت بیمارستان امام حسن(ع) بجنورد

### داروهای خوراکی دیابت

تایید کننده :

دکتر حبیبه سادات شاکری  
فوق تخصص بیماری های غدد  
کد محتوا : ۷۰

گروه هدف : بیماران

تابستان ۹۹

### « داروهای خوراکی دیابت »

نام دارو	شکل دارو	نحوه اثر دارو	زمان مصرف دارو	نکات خاص هنگام مصرف د
گلی بنگلامید	قرص ۵ میلی گرم	درمان دیابت نوع ۲ با آزادسازی انسولین از لوزالمعده قند خون را کاهش می دهد.	قبل از غذا	<p>* در ابتدای شروع مصرف ممکن است حالت تهوع و استفراغ شدید داشته باشید که موقت بوده و برطرف می شود</p> <p>* در صورتی که داروهای ضد انعقاد خوراکی ( وارفارین ، پلاویکس ) ، فنی تونین ، داروهای تیروئیدی و داروهای ضد فشار خون که ادرار آور هستند مصرف می کنید به پزشک معالج خود اطلاع دهید .</p> <p>* دارو را طبق تجویز پزشک مصرف نمایید و خودسرانه قطع و کم و زیاد نمایید .</p> <p>* برای جلوگیری از افت قند وعده های غذایی و میان وعده را حذف ننمایید.</p>

<p>* پیش از شروع درمان با این قرص و سپس بصورت دوره ای آزمایشات عملکرد کلیه و کبد بررسی شود .</p> <p>* در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد خوراکی ( وارفارین ، پلاویکس ) پزشک معالج خود را مطلع نمایید .</p> <p>* ۴۸ ساعت قبل و ۴۸ ساعت بعد از تزریق ماده حاجب وریدی ( برای برخی تصویر برداری ها انجام می شود ) باید دارو قطع شود.</p> <p>* در صورت بروز اسهال و استفراغ با مصرف این قرص به پزشک اطلاع دهید .</p>	<p>با غذا یا بلافاصله بعد از غذا</p>	<p>درمان دیابت نوع ۲ - قند تولید شده از کبد را کاهش می دهد - باعث کاهش مقاومت سلول های بدن به انسولین شده و جذب قند خون راحت تر می شود .</p>	<p>قرص ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم</p>	<p><b>متفورمین</b></p>
<p>* در بیماران سیروز کبدی و کولیت التهابی و انسداد گوارش استفاده نشود .</p> <p>* نفخ شدید و اسهال را به پزشک معالج اطلاع دهید.</p>	<p>با غذا</p>	<p>درمان دیابت نوع ۲</p> <p>جذب گلوکوز (قند) را از روده به تأخیر انداخته و در نتیجه قند به آهستگی وارد خون می شود در نتیجه مانع افزایش ناگهانی قند خون می شود .</p>	<p>قرص ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم</p>	<p><b>آکاربوز ( گلوکو نورم یا گلوکو بای )</b></p>
<p>* در صورت عفونت تنفسی ، سردرد ، درد عضلانی ، زخم گلو ، دندان درد ، افزایش وزن و ورم پاها و خستگی بیش از حد ، پزشک معالج را مطلع نمایید .</p> <p>* این دارو و اثر داروهای ضد بارداری خوراکی را کاهش می دهد.</p>	<p>قبل یا بعداز غذا</p>	<p>درمان دیابت نوع ۲</p> <p>با افزایش حساسیت سلول های بدن نسبت به انسولین قند خون را کنترل می کند .</p>	<p>قرص ۱۵ ، ۳۰ ، ۴۵ میلی گرم</p>	<p><b>پیوگلیتازون ( پیتوز یا گلو تازون )</b></p>
<p>* سردرد ، دندان درد ، درد مفاصل و برونشیت را به پزشک معالج اطلاع دهید .</p> <p>* در بیماران کلیوی ، دوران شیردهی و بارداری ممنوع می باشد .</p>	<p>۱۵ دقیقه قبل از غذا مصرف شود .</p>		<p>قرص ۰.۵ ، ۱ ، ۲ میلی گرم</p>	<p><b>ریپاکلینید ( نئوبت )</b></p>

<p>* در اوائل برنامه ریزی از انجام فعالیتهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند پرهیز نمایید .</p> <p>* در صورت مصرف داروهایی مثل فنی توئین ، ریفامپین و کورتون لازم است به پزشک معالج اطلاع دهید .</p>	<p>نیم ساعت قبل از غذا مصرف شود .</p>	<p>درمان دیابت نوع ۲</p> <p>افزایش تولید انسولین در لوزالمعده می شود .</p>	<p>قرص ۸۰ میلی گرم</p>	<p><b>زیرامد</b></p> <p><b>(کلی کلایید یا دیابزید)</b></p>
---	---------------------------------------	--	------------------------	--

### مراقبت های کلی :

- ❖ دارو را مطابق تجویز پزشک و به موقع مصرف نمایید ، دارو را خودسرانه قطع و کم و زیاد نکنید .
- ❖ در صورت فراموش کردن یک دوز ، اگر تا دوز بعدی زمان اندکی مانده باشد از مصرف آن خودداری نموده و دوز بعدی را ۲ برابر ننمائید .
- ❖ در صورت بارداری و یا شیردهی پزشک معالج خود را مطلع نمائید.
- ❖ برای جلوگیری از افت قند خون مصرف وعده های غذایی و میان وعده ها را جدی بگیرید .
- ❖ علائم افت قند و هایپو گلیسمی را بشناسید . گرسنگی ، تعریق زیاد و سرد ، کرخت شدن دست و پا، سر درد و سر گیجه، خواب آلودگی، احساس وحشت و عصبانیت در صورت وجود این علائم فوراً مواد قندی ( ۴ حبه قند در نصف لیوان آب ) و بعد از ۱۵-۲۰ دقیقه یک میان وعده ( یک سهم میوه یا ۲ عدد بیسکویت ساقه طلایی ) میل نمایید.
- ❖ در ابتدای شروع مصرف قرص ها و در فواصل منظم ( ماهانه سه روز و هر روز ۴ نوبت ) از موارد زیر ( قندهای ناشتا قبل از وعده های غذایی و ۲ ساعت بعد از وعده های غذایی و قبل از خواب ) را انتخاب و چک نمائید و در دفترچه یادداشت نمایید.
- ❖ داروها را در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید .

### منابع

- ❖ داروهای ژنریک ایران؛ تألیف دکتر رامین خدام
- ❖ درسنامه رسمی داروهای رسمی ایران - ایران فارما؛ تألیف دکتر سعید شهرآز - دکتر طاهره غازیانی
- ❖ مرجع جامع داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری و مراقبت؛ تألیف و ترجمه پوران سلمی
- ❖ \*اطلاعات دارویی با رویکرد بالینی تألیف دکتر تقوی معصومی - دکتر خلیلی

وب سایت <https://www.drugs.com>

<https://www.daroonama.com>