




مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)

راهنمای انجام

آنژیوگرافی



دفتر آموزش سلامت بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد

تایید کننده:

دکتر زندگی

متخصص بیماری های قلب و عروق

کد محتوی: ۵۰

گروه هدف: بیماران

پاییز ۱۳۹۸

علائم هشدار دهنده جهت مراجعه فوری:
در صورت درد شدید قفسه سینه یا محل آنژیوگرافی
یا گرفتگی صدا و یا بثورات جلدی به نزدیکترین
اورژانس قلب مراجعه نمایید.

جواب آنژیوگرافی:

- پس از آنژیوگرافی و زمان ترخیص، جواب آنژیوگرافی که شامل CD و گزارش است به بیمار داده میشود.
- با بیمار و یا همراهان توسط پزشک معالجه در مورد یافته های آنژیوگرافی صحبت و توضیح داده می شود.
- ادامه درمان در زمان ترخیص توسط پرستار مربوط توضیح داده می شود

منابع:

پرستاری داخلی - چراحی برونر - سودارت بیماریهای قلب و عروق ۲۰۱۸
اصول مراقبت های ویژه در سی سی یو، ملاحظ نیک روان

❖ پاسخگویی به سوالات بعد از ترخیص هر روز به جز ایام

تعطیلات ساعت ۱۴ الی ۱۵: خانم ریحانی
۰۹۱۵۶۴۱۶۸۹۳

❖ شماره تلفن نوبت دهی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی:

۰۵۸-۳۱۵۱۴۴۰۰

❖ سامانه نوبت دهی اینترنتی درمانگاه تخصصی و فوق

تخصصی:

www.Nobat-ihh.nkums.ac.ir

❖ سایت آموزش به بیمار www.help.tums.ac.ir

▪ هنگام ترخیص محل آنژیوگرافی از نظر هماتوم بررسی شده و در صورت شک به موارد ذکر شده، تا بررسی لازم و حاصل شدن اطمینان بیمار مرخص نمی گردد.

عوارض آنژیوگرافی:

- احساس گرمی یا گر گرفتگی حین تزریق ماده حاجب که بعد از تزریق برطرف می شود.
- تجمع خون در محل آنژیوگرافی که در اکثر موارد با استراحت و مراقبتهای پزشکی بهبود می یابد.
- احساس درد در کشاله ران که ممکن است دو تا سه هفته طول بکشد.
- درد گذرای قفسه سینه که خود به خود بر طرف می شود.
- بروز حساسیت به ماده حاجب که عبارتند از حساسیت پوستی، افت فشار خون، مشکلات تنفسی و هوشیاری که با داروهای ضد حساسیت کنترل می شود.
- عفونت در محل ورود لوله انعطاف پذیر از عوارض نادر است که با تجویز آنتی بیوتیک بر طرف می شود.
- بروز عوارض بسیار نادر مانند سکته قلبی، سکته مغزی و پارگی عروق

آنژیوگرافی چیست؟

آنژیوگرافی به روشی از تصویر برداری از عروق خونی قسمت های مختلف بدن از جمله قلب، کلیه ها، مغز، کاروتید و... با استفاده از ماده حاجب و اشعه ایکس گفته می شود.

چرا آنژیوگرافی انجام می دهیم؟


آنژیوگرافی یکی از بهترین و قطعی ترین روش های تشخیص در بیماری های عروق خونی می باشد.

روش انجام آنژیوگرافی قلب:

بیمار پس از پذیرش به اتاق آنژیوگرافی منتقل می شود. در این اتاق یک دستگاه آنژیوگرافی قرار دارد که شامل یک تخت متصل به تجهیزات تابنده اشعه ایکس و صفحات نمایشگر می باشد. بیمار روی تخت دراز کشیده و آنژیوگرافی از طریق کشاله ران و گاهی از راه دست انجام می گیرد. کشاله ران یا بازو با ماده ضد عفونی کننده شسته و کاملاً تمیز می گردد و با یک پارچه پوشانده می شود. پس از بی حس کردن موضع، سوزن و به دنبال آن لوله پلاستیکی انعطاف پذیری وارد شریان می شود. با استفاده از کاتترهای مخصوص ماده حاجب داخل عروق تزریق می شود و با تابش همزمان اشعه ایکس، تصویر برداری از عروق انجام می شود. تصاویر روی صفحه نمایشگر مقابل پزشک دیده می شود و بررسی های لازم انجام می گیرد. همین مراحل در مورد وریدها نیز انجام می شود که ونوگرافی نامیده می شود.

آمادگی های قبل از آنژیوگرافی

- تا ۸ ساعت قبل از آنژیوگرافی ناشتا باشد.
- شیو موهای ناحیه (ناحیه زهار، پایین ناف تا وسط ران در هر دو طرف)
- بررسی وضعیت حساسیت بیمار به دارو، مواد غذایی (غذاهای دریایی: ماهی و حساسیت به مواد ید دار)
- در خصوص داروهای مصرفی: می توانید داروهایتان را طبق نظر پزشک ادامه دهید.
- صبح روز آنژیوگرافی داروهای انسولین، هپارین، گلی بن کلامید و متفورمین را قطع کنید. وارفارین نیز با توجه به جواب آزمایش PT (پی تی) و طبق دستور پزشک از چند روز قبل قطع شود.
- نوار قلب و اکوکاردیوگرافی
- لزوم حضور یک نفر همراه
- به همراه داشتن دفترچه بیمه



مراقبتهای پس از آنژیوگرافی

- پس از خروج لوله انعطاف پذیر، خونریزی محل با فشار دست پرستار حداقل به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه تاختم شدن کامل کنترل شده و سپس کیسه شن روی محل گذاشته می شود.
- پس از انجام آنژیوگرافی بیمار به مدت ۴ ساعت روی تخت به صورت طاق باز دراز می کشد. فشار خون، نبض و نبض روی پا کنترل می شود.
- در صورت عدم بروز مشکل بیمار بعد از ۴ ساعت از تخت پایین می آید.
- در صورتی که آنژیوگرافی از شریان فمورال (ران) انجام شود. نبض انتهای اندام تحتانی به طور مرتب کنترل میشود.
- محل ورود لوله انعطاف پذیر مرتب از نظر خونریزی و هماتوم (خون مردگی) کنترل می شود.
- در طی این مدت جواب آنژیوگرافی بیمار آماده شده و در مورد، بستری و یا ترخیص بیمار، طبق نظر پزشک مربوطه تصمیم گیری می شود.
- بیمار روز بعد از آنژیوگرافی می تواند به حمام برود.
- در صورتیکه بیمار قبل از آنژیوگرافی وارفارین مصرف می کرده، پس از انجام آنژیوگرافی طبق نظر پزشک می تواند داروی خود را مصرف نماید.
- بیمار باید تا ۲۴ ساعت پس از آنژیوگرافی استراحت کند و تا یک هفته از فعالیتهای شدید بدنی خودداری نماید.