



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)

چراغ راهنمای تشخیص دیابت

قند ناشتا: ۱۲۶ و بالاتر
۲ ساعت بعد از غذا: ۲۰۰ و بالاتر

قند ناشتا: ۱۲۵-۱۰۰
۲ ساعت بعد از غذا: ۱۹۹-۱۴۰

قند ناشتا: ۹۹ و پایین تر
۲ ساعت بعد از غذا: ۱۳۹ و پایین تر



سرپرست مرکز: دکتر حبیبه سادات شاکری فوق تخصص غدد

تایید کننده:

دکتر حبیبه سادات شاکری فوق تخصص غدد

کد محتوا: ۶۳

گروه هدف: بیماران

پاییز ۱۴۰۱

بازنگری مجدد: بهار ۱۴۰۵

اندازه گیری HbA_{1c} (هموگلوبین ای وان سی) تعیین کننده میزان قند خون در سه ماهه گذشته میباشد که مقدار بیشتر از ۶ نشانه ابتلا به بیماری میباشد.

منابع:

❖ پرستاری داخلی جراحی برونر سوارث بیماری های غدد ۲۰۲۲

❖ <http://darman.tums.ac.ir>

❖ پاسخگویی به سوالات بعد از ترخیص هر روز به جز ایام تعطیلات ساعت ۱۴ الی ۱۵: خانم ریحانی ۰۹۱۵۶۴۱۶۸۹۳

❖ سامانه نوبت دهی اینترنتی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی:

www.Nobat-ihh.nkums.ac.ir

❖ شماره تلفن نوبت دهی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی: ۰۵۸-۳۱۵۱۴۲۲۰

❖ آدرس سایت آموزش به بیمار بیمارستان جهت کسب اطلاعات بیشتر:

www.nkums.ac.ir

HbA_{1c} در تخمین وضعیت بیماری و کنترل آن نقش دارد).

آزمایش نتیجه	قند خون ناشتا (FBS) (۸) ساعت (ناشتا)	قند خون ۲ ساعت بعد از غذا یا قندخون غیرناشتا (Bs)	کنترل قند سه ماهه HbA_{1c}
سالم	۷۰ تا ۹۹ گرم در دسی لیتر	کمتر از ۱۴۰ میلی گرم در دسی لیتر	۵/۵ - ۵ درصد
پیش دیابت	۱۰۰ تا ۱۲۵ میلی گرم در دسی لیتر	۱۴۰-۱۹۹ میلی گرم در دسی لیتر	۶/۵-۶ درصد
دیابت	بیشتر از ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر	بیشتر از ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر	بیشتر از ۶ درصد

Diabetes Guide



قند ناشتا: ۱۲۶ و بالاتر
۲ ساعت بعد از غذا: ۲۰۰ و بالاتر

قند ناشتا: ۱۰۰-۱۲۵
۲ ساعت بعد از غذا: ۱۴۰-۱۹۹

قند ناشتا: ۹۹ و پایین تر
۲ ساعت بعد از غذا: ۱۳۹ و پایین تر

اگر قند خون به صورت تصادفی بیشتر از
 200 mg/dl در دو نوبت

تست تحمل گلوکز GTT

که در آن قند خون دو ساعت بعد از مصرف ۷۵ گرم گلوکز اندازه گیری می شود و مقادیر بیشتر از ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر نشانه دیابت است

وضعیت	نتیجه تست تحمل گلوکز
طبیعی	کمتر از 140 mg/dl
اختلال تحمل گلوکز	بین 140 mg/dl تا 199 mg/dl
دیابت	بیشتر از 200 mg/dl

روش های تشخیص دیابت

روش های عادی برای تشخیص دیابت آزمایش قند خون و ادرار می باشد. پزشک برای تشخیص دیابت شما معمولاً آزمایشات زیر را درخواست می کند. تشخیص قطعی دیابت با دو بار آزمایش غیرطبیعی در دو نوبت می باشد. قند خون ناشتا (FBS) = شما به مدت ۸ ساعت ناشتا می باشید از شما نمونه خون گرفته میشود.

وضعیت	نتیجه آزمایش قند خون ناشتا
طبیعی	۷۰-۹۹ میلی گرم در دسی لیتر
پیش دیابت (قندخون ناشتا مختل)	۱۰۰-۱۲۵ میلی گرم در دسی لیتر
دیابت	بیشتر از ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر